

Poster

POJAVA POTENCIJALNO ŠTETNIH LEPTIRA U 2015. GODINI U SOMBORU I ČELAREVU I PROGNOZA ZA 2016. GODINU

Dragan Vajgand

Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, Sombor

vajgandd@sbb.rs

Praćenje leptira *Loxostege sticticalis* (Linnaeus, 1761), *Spodoptera exigua* (Hübner, 1808), *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758), *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758), *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766), *A. exclamationis* (Linnaeus, 1758), *A. segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775) i *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) je tokom 2015. godine vrše-
no radi utvrđivanja brojnosti leptira i davanja dalje prognoze pojave. Korišćena je svetlosna klopka tip RO Agro-
bečej u Somboru i Čelarevu.

L. sticticalis – metlica je bila malobrojna. Zabeleženi su pojedinačni primerci u julu i avgustu. Za noć je za-
beleženo najviše sedam primeraka.

S. exigua je bila malobrojna. Ipak, brojnost je bila dosta veća u odnosu na prosečne brojnosti, ali nije bila
ekonomski značajna.

L. oleracea – povrtna sovica je bila prisutna u dve generacije. Brojnost je bila dvostuko veća nego prošle go-
dine, ali malo veća u odnosu na višegodišnji prosek. Nije predstavljala ekonomski značajnu vrstu u poljoprivred-
noj proizvodnji. Koeficijent generacije predviđa povećanje brojnosti leptira prve generacije u proleće 2016. go-
dine. S obzirom na brojnost mogu se očekivati štete od prve generacije ove vrste na kupusu, a lokalno verovat-
no i u šećernoj repi.

M. brassicae – kupusna sovica je takođe bila prisutna u dve generacije. Brojnost je bila više nego dvostruko
veća u odnosu na prošlu godinu. Ekonomski je bila značajna samo lokalno na kupusu, ali ne i na šećernoj repi.

A. ipsilon – ipsilon sovica je bila malobrojna. Hvatani su samo pojedinačni primerci. Nije bila ekonomski zna-
čajna.

A. exclamationis – usklična sovica i *A. segetum* – ozima sovica su bile veoma brojne. Dostigle su najveću vred-
nost u poslednjih desetak godina. U usevima krompira i mrkve bilo je potrebe za suzbijanjem tokom avgusta
meseca. Koeficijent generacije je pozitivan. Saopštava se pozitivna prognoza za prvu generaciju gusenica ove
vrste u 2016. godini. S obzirom na brojnost leptira, pažnju treba obratiti na šećernu repu, suncokret i kukuruze
koji se seju u kasnijim rokovima setve.

H. cunea – dudovac je bio malobrojan. Hvatani su samo pojedinačni primerci. Nije bila ekonomski značajna.