


ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA



XV Simpozijum entomologa Srbije
XV Symposium of Serbian entomologists

Sombor, 04-06. XII 2025.



Organizacioni odbor

Prof. dr Aleksandra Konjević

Doc. dr Mihaela Kavran

Dr Željko Milovac

Dr Filip Franeta

Dr Dejan V. Stojanović

Vojin Puzić

Milana Čović

Autor slike: Sara Šiljegović

Suorganizatori

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija



Република Србија

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И
ИНОВАЦИЈА

Poljoprivredna stručna služba Sombor



Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu



POLJOPRIVREDNI
FAKULTET
UNIVERZITET U NOVOM SADU

PRILOG POZNAVANJU FAUNE NOĆNIH LEPTIRA I MOLJACA PADINSKE SKELE (PALILULA, BEOGRAD)

Dragan Vajgand^{*1}, Eleonora Onć-Jovanović², Zlata Gavrilović³

¹Agroprotekt doo, Sombor

²Poljoprivredna savetodavna i stručna služba, Beograd

³Henkel Srbija, Kruševac

E-mail: *vajgandd@gmail.com

Padinska skela je naselje između Tamiša i Dunava. Pripada Pančevačkom ritu i sa aspekta faune leptira je slabo istraženo. Postoje publikovani podaci o samo petnaest vrsta noćnih leptira. Cilj rada je doprinos poznavanju noćnih leptira i moljaca ovog područja.

Sakupljanje leptira je izvršeno u periodu do 26. avgusta do 22. septembra 2010. godine. Za privlačenje je korištena svetlosna klopka model Kombinat Bečej. Kao izvor svetla je korištena živina sijalica snage 250W. Svetlosna klopka je bila postavljana na oglednom polju Instituta PKB Agroekonomika u Padinskoj skeli. Lokalitet na UTM karti nalazi se u kvadratu sa oznakom DQ57. Leptiri su svakodnevno vađeni iz klopke a za omamljivanje je korišten insekticid sa aktivnom materijom dihlorvos.

Prikupljeno je i determinisano ukupno 1053 primerka koji su svrstani u 73 vrste.

Po familijama je determinisano: Crambinae 7 vrsta; Drepanidae 3 vrste; Lasiocampidae 1; Sphingidae 1; Geometridae 10 vrsta; Notodontidae 2; Erebidae 13; Nolidae 2 i Noctuidae 34 vrste.

Većina zabeleženih vrsta su uobičajene i široko rasprostranjene u Srbiji. Vrste koje su registrovana ne menjem broju mestu u Srbiji ili nisu registrovana u blizini ovog lokaliteta, pa ih zato treba spomenuti su: *Elophila nymphaeata* (Linnaeus, 1758), *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766), *Narraga fasciolaria* (Hufnagel, 1767), *Laelia coenosa* (Hübner, 1808), *Pelosia obtusa* (Herrich-Schäffer, 1847), *Earias clorana* (Linnaeus, 1761), *Gortyna flavago* (Denis & Schiffermüller, 1775) (1), *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784) i *Tholera cespitis* (Denis & Schiffermüller, 1775).

Ključne reči: Lepidoptera, Padinska skela, fauna, leptir