

AGROPROTEKT^{DOO}

Nikole Pašića 9, 25000 Sombor

vajgandd@sbb.rs


tel: 063-326772

fax: 025-444905


Rod i vrsta	Trenutno stanje 01. do 09. septembar	Prognoza za period od 09. do 19. septembra
<i>Agrotis segetum</i>	Registrovani su samo pojedinačni primerci u južnoj Bačkoj.	Očekuje se ulov pojedinačnih primeraka
<i>Agrotis exclamationis</i>	Registrovani su samo pojedinačni primerci u južnoj Bačkoj.	Isto kao i kod <i>Agrotis segetum</i>
<i>Agrotis ipsilon</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se pojava pojedinačnih leptira.
<i>Lacanobia oleracea</i>	Hvatani su pojedinačni primeci.	Očekuje se stagnacija brojnosti leptira. Na kupusnjačama i dalje ima novih jajnih legala, pa treba vršiti zaštitu i tokom ovog perioda.
<i>Mamestra brassicae</i>	Hvatani su pojedinačni primeci.	Očekuje se stagnacija brojnosti leptira. Na kupusnjačama i dalje ima novih jajnih legala, pa treba vršiti zaštitu i tokom ovog perioda.
<i>Autographa gamma</i>	Hvatani su pojedinačni primeci.	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Helicoverpa armigera</i>	Brojnost leptira je tokom ovog perioda značajno porasla. Tokom ovih devet dana je ulovljeno skoro isti broj primeraka kao tokom ove cele godine do sada!!! Posle 2003. godine, kada je registrovana najveća brojnost do sada, ovo je sledeća godina po brojnosti (za sada)!!!	Očekuje se stagnacija ili porast brojnosti leptira. Na usevima paradajza, paprike (industrijske i babure), kukuruzu (običnom, a posebno šećercu), duvanu, postrnoj soji i boraniji nastaviti sa pregledima i zaštitom useva. Jaja i gusenice se masovno mogu nalaziti i na kupusnjačama!!! Zaštitu svih useva koji su navedeni treba ponoviti, zavisno od preparata koji je korišten u roku od 5 do 12 dana od predhodnog tretmana. Voditi računa o karenci preparata: kod nas u paprici Avaunt 3 dana, Lannate 14 dana, piretroidi i Actellic uglavnom 7 dana. U kukuruzu šećercu Avaunt 3 dana u Mađarskoj. U soji koristiti bilo koji od navedenih preparata, jer nema registrovan ni jedan insekticid. U slučaju velike brojnosti jaja i gusenica povećavati količine vode prilikom tretiranja, količine insekticida, a radi bolje pokrovnosti može se dodavati i okvašivač !
<i>Spodoptera exigua</i>	Registrovani prvi pojedinačni primerci	Moguć ulov pojedinačnih leptira.

<i>Ostrinia nubilalis</i>	Porast brojnosti ženki u predhodnom periodu nije bio privremen. Brojnost na klopkama je veoma velika!!! Tokom ovih devet dana je ulovljeno više primeraka nego tokom cele poslednje dve godine. Čini se da je u toku let treće generacije leptira, koja nije kod nas uobičajena!	U poslednjim izveštajima su navedeni optimalni rokovi za primenu pojedinih preparata (preparatom Rimon odmah, Avaunta u periodu od 08. do 12. septembra, a Lannatea, piretroida i pirimifosmetila je 12 do 16. septembar). Na području cele Vojvodine obaviti pregled kukuruza koji se još uvek zelene i paprike. Tretmane će skoro sigurno trebati ponoviti nakon 7 do 10 dana od prvog tretmana!!! Obzirom da se vrsta javlja na kukuruza i paprici, na kojima je potrebno tretiranje zbog vrste <i>Helicoverpa armigera</i> , hemijsko suzbijanje će pokriti obe štetočine.
<i>Loxostege sticticalis</i>	Registrovani su pojedinačni leptiri.	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Hyphantria cunea</i>	Nije bilo registrovanih leptira.	Moguć ulov pojedinačnih leptira.

Let *Ostrinia nubilalis*



Let *Helicoverpa*



najsvetlija siva zona prosečan let, srednje sivi stubić brojnost u Somboru, tamnije sivi stubić brojnost u Čelarevu.

Dole su datumi avgust i septembar po pet dana