

AGROPROTEK DOO

Nikole Pašića 9, 25000 Sombor

vajgandd@sbb.rs

tel: 063-326772

fax: 025-444905

Rod i vrsta	Trenutno stanje 05. do 11. avgusta	Upozorenje za period od 11. do 21. avgusta
<i>Agrotis segetum</i>	Dogodilo se blago povećanje broja primeraka na jugu Bačke, ali su i to pojedinačni primerci.	Očekuje se pad ili stagnacija brojnosti leptira. Na mestima gde je brojnost bila visoka predhodnih godina, ponoviti tretman na 7 do 10 dana od prvog tretmana. Pošto se gusenice hrane noću, prskanje treba obaviti kasno uveče ili noću dva do pet dana nakon navedenih perioda piretroidima ili hlorpirifosom. Obzirom na blago povećanje brojnosti treba ponoviti tretman i ako je rađeno hlorpirifosom.
<i>Agrotis exclamationis</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se pad brojnosti ili stagnacija. Ostalo kao i kod <i>Agrotis segetum</i> .
<i>Agrotis ipsilon</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Pojava pojedinačnih leptira.
<i>Lacanobia oleracea</i>	Brojnost leptira je blago porasla. Registrovan je i pik u letu.	Očekuje se stagnacija ili blago povećanje brojnosti leptira. Tokom ove nedelje očekuje se nešto obimnije piljenje gusenica. Obratiti pažnju na useve kupusnjača. U Somboru su pronađana brojnija jajna legla na karfiolu, kupusu i kelju pupčaru.
<i>Mamestra brassicae</i>	Hvatali su se pojedinačni primerci.	Očekuje se stagnacija ili pad brojnosti. Treba nastaviti sa pregledima kupusnjača na prisustvo jaja i gusenica.
<i>Autographa gamma</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se porast brojnosti leptira.
<i>Helicoverpa armigera</i>	Brojnost je blago opala. Počele su da se love mlade izležene ženke.	Očekuje se porast brojnosti leptira i gusenica. Useve i tokom ovog perioda treba pregledati na prisustvo jaja. U okolini Sombora je mala brojnost novopoloženih jaja.
<i>Spodoptera exigua</i>	Nema uhvaćenih primeraka	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Iako je broj ženki na jednoj klopcu stagnirao a na drugoj bio u porastu, brojnost je i dalje veoma visoka!	Očekuje se stagnacija ili blagi pad brojnosti leptira. Na mestima gde je ustanovljena visoka brojnost jajnih legala jedan tretman insekticidma neće biti dovoljan. I tokom ovog perioda se preporučuje pregled useva kukuruza, na prisustvo jajnih legala. Osim kukuruza pri ovakvoj brojnosti pažnju treba obratiti i na papriku. Preporučuje se ponavljanje tretmana insekticidom na 7 do 10 dana od prvog tretmana. U okolini Sombora na postrnim usevima kukuruza šećerca je konstatovano prisustvo u proseku jednog jajnog legla po biljci!!!

<i>Loxostege sticticalis</i>	Pojedinačan ulov leptira.	Očekuje se hvatanje pojedinačnih leptira.
<i>Hyphantria cunea</i>	Nije bilo registrovanih leptira.	Tokom ovog perioda još jednom treba izvršiti pregled voćaka i ukrasnog bilja na prisustvo ispiljenih gusenica i zapredaka. Ako ih sada nema, novih piljenja gusenica ove godine neće biti.