

# **AGROPROTEK DOO**

Nikole Pašića 9, 25000 Sombor

vajgandd@sbb.rs

tel: 063-326772

fax: 025-444905

Rod i vrsta	Trenutno stanje 15. do 19. avgusta	Upozorenje za period od 19. do 29. avgusta
<i>Agrotis segetum</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se pad ili stagnacija brojnosti leptira.
<i>Agrotis exclamationis</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se pad brojnosti ili stagnacija.
<i>Agrotis ipsilon</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Pojava pojedinačnih leptira.
<i>Lacanobia oleracea</i>	Brojnost leptira je stagnirala na umereno velikoj brojnosti.	Očekuje se stagnacija ili blago povećanje brojnosti leptira. Obratiti pažnju na ovu vrstu i tokom ovog perioda. U Somboru je u toku masovno piljenje jaja, ali se nalaze i brojna jajna legla na karfiolu, kupusu i kelju pupčaru.
<i>Mamestra brassicae</i>	Hvatali su se pojedinačni primerci.	Očekuje se stagnacija ili pad brojnosti. Treba nastaviti sa pregledima kupusnjača na prisustvo jaja i gusenica.
<i>Autographa gamma</i>	Hvataju se pojedinačni primerci.	Očekuje se stagnacija brojnosti leptira.
<i>Helicoverpa armigera</i>	Tokom ovog perioda brojnost leptira na svetlosnoj klopcu je bila visoka.	Očekuje se porast ili stagnacija brojnosti leptira. U toku je masovno polaganje jaja. U okolini Sombora na paradajzu i paprici baburi se nalazi po jedno do dva jajeta po plodu. Na industrijskoj paprici je u proseku jedno jaje na dva do pet plodova. Na kukuruzu šećercu u navodnjavanju u okolini Sombora, pored Tise, u Novom Miloševu ima u proseku oko 5 jaja po biljci. Na kukuruzima van sistema za navodnjavanje (zavisi od zrelosti useva) ima od jednog jajeta po biljci do jednog jajeta na 10 biljaka. Na duvanu ima i do 40 jaja po cvasti, u proseku oko 5 jaja! Na usevima soje koji se zelene na mahunama i biljkama ima po jedno do dva jajeta po biljci. Slično je i u boraniji. Po jedno jaje na osam do deset plodova je registrovano na šljivi u jednom voćnjaku! U celoj Vojvodini, u naredna dva tri dana zaštitu useva raditi preparatom Avaunt. U naredna tri do pet dana zaštitu useva raditi preparatima Thionex, Lannate, Actellic i piretroidima. Voditi računa o karenci preparata: kod nas u paprici Avaunt 3 dana, Lannate 14 dana, piretroidi i Actellic uglavnom 7 dana. U kukuruzu šećercu Avaunt 3 dana u Mađarskoj. Decis u šljivi u Mađarskoj tri dana. U soji koristiti bilo koji od navedenih preparata, jer nema registrovan ni jedan insekticid.

<i>Spodoptera exigua</i>	Nema uhvaćenih primeraka	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Brojnost ženki na klopkama je jako mala.	Očekuje se stagnacija ili blagi pad brojnosti leptira. Moguća je pojava novih jajnih legala, ali ona neće biti brojna.
<i>Loxostege sticticalis</i>	Nije bilo registrovanih leptira.	Moguć ulov pojedinačnih leptira.
<i>Hyphantria cunea</i>	Nije bilo registrovanih leptira.	Moguć ulov pojedinačnih leptira.