

Šimširov plamenac - *Cydalima perspectalis*

Opis: Raspon krila je 35 do 40mm. Osnovna boja krila je može jako da varira. Najčešće je osnovna boja bela, a rub krila crnomrk. Pojavljuju se i primerci koji su potpuno jednobojni, sivi. Obe forme kod prednjeg ruba prednjih krila imaju polumesečastu belu šaru. Krila imaju jak metalik odsjaj.

Gusenice se razvijaju na šimširu (*Buxus*).

Štete: larva se najpre hrani na površini lista, a kasnije jede cele listove. Pošto jaja polaže u jajna legla, na jednom mestu se obično nađe veliki broj larvi koje ispredaju zapredke, gnezda od svile. U njima se nalazi veliki broj malih gusenica i kada porastu oko gnezda se javlja golobrst. Kasnije golobrst se širi na veći deo žbuna i ukoliko se golobrst ponovi, žbun se potpuno osuši.

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): je velika. Ulovi se samo po koji leptir pamukove sovice (*Helicoverpa armigera*) koja se lako razlikuje, po boji, obliku i veličini.


Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje.

Odabir vrste klopke: preporučuje se VARL vršasta klopka. Najbolje je da se postavi na visini od 1 do 1,5m u krošnju žbuna ili drveta. Klopke su odlične za određivanje prisustva i dinamike leta šimširovog moljca. Uobičajen početak leta leptira je početkom juna. Prvi tretman treba obaviti 10 do 14 dana od pojave prvog ulovljenog leptira. Zaštitu treba ponavljati svakih 10 do 14 dana, sve dok se hvata više od 10 primeraka nedeljno. Ukoliko je brojnost leptira u nekom periodu manja, tretmani se mogu odlagati. Ima tri generacije godišnje i prisutna je sve do sredine novembra.



35 - 40 mm

izgled leptira koji se hvataju na klopku



Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: <http://www.julia-nki.hu/traps/>.

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs


podelite na sajtu podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

Više podataka o upotrebi feromonskih klopki pročitajte na <http://agroprotekt.leptiri.co.rs/klopke.htm>


Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temperaturi od -5 do -10°C (u zamrzivaču)

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE KLOPKE TIP VARL+


1. Ugurajte držač (B) u rupicu na bočnoj letvi (C). Uradite isto na drugoj strani plastičnog držača.



2. Postavite posudu za sakupljanje (A) na donju stranu levka (D) i pričvrstite je držačem (B).
3. Postavite zeleni poklopac (E) na levak i učvrstite ih sa strane kroz rupe (F) koje su na bočnoj letvi.
4. Otvorite alufoliju (G) u kojoj je kapsula sa mirisnim mamkom.
5. Postavite kapsulu (I) pažljivo kroz rupu (K) i pričvrstite je čepom (J) kroz rupicu tako da kapsula bude na sredini rupe (K).



6. Sastavljenu klopku učvrstite žicama na stablo ili na nosač klopke.



Napomena Alufolije u kojima su kapsule sa mirisnim mamacima treba držati na temperaturi od -10°C (u zamrzivaču)

