


Žuti moljac grožđa - *Eupoecilia ambiguella*

Opis: Telo leptira je 6 do 7mm dužine, a raspon krila 13 do 15mm. Prednja krila su bledožuta do slamenozuta, sa karakterističnom trouglastom šarom mrke boje. Zadnja krila su sivobela, sa braonsivim resama. **Biljke domaćini su:** grožđe i ribizle. **Štete:** Larve prve generacije u proleće uništavaju cvetove, posebno one koji su nisko na čokotu. Larve druge generacije oštećuju bobice praveći rupe u njima.




Klopku treba postaviti u vinogradu u visini najviših listova, zavisno od uzgojnog oblika, obično na visinu od 1 do 1.5 m. Početak ulova leptira je obično sredinom aprila.

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): u blizini šume se hvataju mnogo veći leptiri roda *Cnephasia*. Hvata se i *C. acullyana*, koja je malo manja od žutog moljca, ali su njegova krila jednolično tamno siva, skoro crna.

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

Klopke su široko rasprostranjen alat za otkrivanje pojave, praćenje dinamike leta leptira i određivanje potrebe i momenta suzbijanja. Suzbijanje je potrebno ukoliko se tokom nedelju dana uhvati više od 25 do 30 leptira. Kada je ostvaren prag štetnosti od 25 leptira za nedelju dana preporučuje se upotreba insekticida, nakon 10 do 14 dana. Prag štetnosti za svaki uzgojni oblik i klimatske uslove treba proveriti, a to se lako uradi tako što se ostavi deo neoprskanih čokota.



Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: <http://www.julia-nki.hu/traps/>.

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite na sajtu podatke iz Vašeg vinograda sa ostalima

Više podataka o upotrebi feromonskih klopki pročitajte na <http://agroprotekt.leptiri.co.rs/klopke.htm>

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temperaturi od -5 do -10°C (u zamrzivaču)