

Šljivin smotavac - *Grapholita funebrana*

Telo leptira je dužine 6 do 9 mm, a raspon krila 9 do 13 mm. Prednje krilo je mrko sivo, sa redovima žućkasto belih dlačica na resici, rubu, krila. Oči su pepeljastosive. Zadnje krilo je braonkasto žuto. Vrsta je veoma slična sa breskvinim smotavcem i jasno se razlikuje jedino preko detalja genitalne armature.


Gusenice se razvijaju na šljivi, breskvi, kajsiji, orahu i jabuci. Gusenice buše rupe u unutrašnjost ploda i hrane se mesom oko koštice. Šteta se ogleda u tome što plodovi ranije dobijaju boju zrelih, sa ljubišastim prelivom, iz njih teče smola i na kraju plodovi prevremeno odpadnu.

Klopke treba postaviti na grane na visini od 1,5 do 2 m visine u krošnju. Uobičajena pojava leptira u Hrvatskoj je sredina aprila.

Selektivnost (prema iskustvima iz Mađarske): zavisi od lokaliteta postavljanja. Obično se ulovi mali procenat vrste *Epiblema scutulana* koja je dva puta veća od šljivinog moljca. U blizini šuma se nekad ulove vrste roda *Pammene* spp. One imaju jasne bele šare na prednjim krilima. Za razliku od feromonskih klopki drugih proizvođača, ovaj feromon je selektivan prema breskvinom smotavcu.

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Promenu lepljive ploče treba vršiti svakih 7 do 10 dana. U slučaju brojnog ulova, lepljivu ploču treba menjati i češće.

Klopka je odlična za određivanje pojave i praćenje brojnosti šljivinog smotavca. Vreme upotrebe pesticida zavisi od brojnosti, a najefikasnija je upotreba pesticida u vreme piljenja gusenica iz jaja i pre njihovog ubušenja u plodove ili mladare. Uobičajeno je da se to dešava 7 do 10 dana nakon najvećeg ulova. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj ovog smotavca i brojnost je velika, zaštitu insekticidima treba ponoviti. U baštama i organskoj proizvodnji štete mogu da se smanje na prihvatljivu meru redovnom i dugotrajnom upotrebom 1 do 2 klopke po stablu. U slučaju masovne pojave leptira lepljive ploče treba menjati pre nego što se zasite leptirima.



Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science. Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézet (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: <http://www.julia-nki.hu/traps/>.

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi
www.agroupozorenje.rs
podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima